令和8年8月27日　第213回社会保障審議会医療保険部会資料より

（別紙2）

別途の負担の対象となる各成分ごとの効能・効果の一覧

領域	対象効成分	効能・効果（医療用）		効能・効果（OTC）	別途の負担の対象・対象外
鎮痛消炎剤（内服）	イブプロフェン	○下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛 関節リウマチ、関節痛及び関節炎、神経痛及び神経炎、背腰痛、頸腕症候群、子宮付属器炎、月経困難症、紅斑（結節性紅斑、多形滲出性紅斑、遠心性環状紅斑） ○手術並びに外傷後の消炎・鎮痛 ○下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）	関節リウマチ	頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・生理痛・外傷痛の鎮痛、悪寒・発熱時の解熱	対象
			関節痛及び関節炎		対象
			神経痛及び神経炎		対象
			背腰痛		対象
			頸腕症候群		対象
			子宮付属器炎		対象
			月経困難症		対象
			紅斑（結節性紅斑、多形滲出性紅斑、遠心性環状紅斑）		対象
			手術並びに外傷後の消炎・鎮痛		対象
			急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）		対象
	ロキソプロフェンナトリウム水和物	○下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛 関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、肩関節周囲炎、頸肩腕症候群、歯痛 ○手術後、外傷後並びに抜歯後の鎮痛・消炎 ○下記疾患の解熱・鎮痛 急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）	関節リウマチ	○頭痛・月経痛（生理痛）・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・腰痛・関節痛・神経痛・筋肉痛・肩こり痛・耳痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・外傷痛の鎮痛 ○悪寒・発熱時の解熱	対象
			変形性関節症		対象
			腰痛症		対象
			肩関節周囲炎		対象
			頸肩腕症候群		対象
			歯痛		対象
			手術後、外傷後並びに抜歯後の鎮痛・消炎		対象
			急性上気道炎（急性気管支炎を伴う急性上気道炎を含む）		対象
鎮痛消炎剤（外用）		下記疾患並びに症状の消炎・鎮痛 変形性関節症、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛	変形性関節症	関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）	対象
			筋肉痛		対象
			外傷後の腫脹・疼痛		対象
	インドメタシン	下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎 変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎（テニス肘等）、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛	変形性関節症	腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫	対象
			肩関節周囲炎		対象
			腱・腱鞘炎		対象
			腱周囲炎		対象
			上腕骨上顆炎（テニス肘等）		対象
			筋肉痛		対象
			外傷後の腫脹・疼痛		対象
	ジクロフェナクナトリウム	下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎 変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎（テニス肘等）、筋肉痛（筋・筋膜性腰痛症等）、外傷後の腫脹・疼痛	変形性関節症	腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫	対象
			肩関節周囲炎		対象
			腱・腱鞘炎		対象
			腱周囲炎		対象
			上腕骨上顆炎（テニス肘等）		対象
			筋肉痛（筋・筋膜性腰痛症等）		対象
			外傷後の腫脹・疼痛		対象
	フェルビナク	下記疾患並びに症状の鎮痛・消炎 変形性関節症、肩関節周囲炎、腱・腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上顆炎（テニス肘等）、筋肉痛、外傷後の腫脹・疼痛	変形性関節症	腰痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫	対象
			肩関節周囲炎		対象
			腱・腱鞘炎		対象
			腱周囲炎		対象
			上腕骨上顆炎（テニス肘等）		対象
			筋肉痛		対象
			外傷後の腫脹・疼痛		対象
	サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエキス	下記における鎮痛・消炎 捻挫、打撲、筋肉痛、関節痛、骨折痛	捻挫	腰痛、打撲（うちみ）、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労	対象
			打撲		対象
			筋肉痛		対象
			関節痛		対象
			骨折痛		対象
	サリチル酸メチル・l-メントール・dl-カンフル	下記における鎮痛・消炎 捻挫、打撲、筋肉痛、関節痛、骨折痛	捻挫	腰痛、打撲（うちみ）、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労	対象
			打撲		対象
			筋肉痛		対象
			関節痛		対象
			骨折痛		対象
	サリチル酸メチル・l-メントール・dl-カンフル・グリチルレチン酸	下記における鎮痛・消炎 捻挫、打撲、筋肉痛、関節痛、骨折痛、虫ささされ	捻挫	肩こり、筋肉痛、腰痛、関節痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、しもやけ	対象
			打撲		対象
			筋肉痛		対象
			関節痛		対象
			骨折痛		対象
			虫ささされ		対象外
抗アレルギー薬	アシタザノラスト水和物	アレルギー性結膜炎	アレルギー性結膜炎	花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：目のかゆみ、目の充血、目のかすみ（目やにの多いときなど）、なみだ目、異物感（コロコロする感じ）	対象
	ペミロラストカリウム	○アレルギー性結膜炎 ○春季カタル	アレルギー性結膜炎	花粉、ハウスダスト（室内塵）などによる次のような目のアレルギー症状の緩和：目の充血、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）、なみだ目、異物感（コロコロする感じ）	対象
			春季カタル		対象

領域	対象効成分	効能・効果(医療用)		効能・効果(OTC)	別途の負担の対象・対象外
抗アレルギー薬	ケトチフェンフマル酸塩	アレルギー性結膜炎	アレルギー性結膜炎	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和:目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)	対象
		○気管支喘息 ○アレルギー性鼻炎 ○蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症	気管支喘息	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻水(鼻汁過多)、鼻づまり	対象外
			アレルギー性鼻炎		対象
			蕁麻疹		対象外
			湿疹・皮膚炎		対象外
			皮膚そう痒症		対象外
	エピナスチン塩酸塩	○気管支喘息 ○アレルギー性鼻炎 ○じん麻疹、湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、痒疹、そう痒を伴う尋常性乾癬	気管支喘息	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:鼻みず、鼻づまり、くしゃみ	対象外
			アレルギー性鼻炎		対象
			じん麻疹		対象外
			湿疹・皮膚炎		対象外
			皮膚そう痒症		対象外
			痒疹		対象外
			そう痒を伴う尋常性乾癬		対象外
		アレルギー性結膜炎	アレルギー性結膜炎	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような目のアレルギー症状の緩和:目の充血、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、なみだ目、異物感(コロコロする感じ)	対象
	フェキソフェナジン塩酸塩	○アレルギー性鼻炎 ○蕁麻疹 ○皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎)に伴うそう痒	アレルギー性鼻炎	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻水、鼻づまり	対象
			蕁麻疹		対象外
			皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎)に伴うそう痒		対象外
	フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:くしゃみ、鼻水、鼻づまり	対象
	ベポタスチンベシル酸塩	〈成人〉 ○アレルギー性鼻炎 ○蕁麻疹 ○皮膚疾患に伴うそう痒(湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症) 〈小児〉 ○アレルギー性鼻炎 ○蕁麻疹 ○皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒	アレルギー性鼻炎	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和: くしゃみ、鼻水、鼻づまり	対象
			蕁麻疹		対象外
			皮膚疾患に伴うそう痒(湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症)		対象外
	ロラタジン	○アレルギー性鼻炎 ○蕁麻疹 ○皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒	アレルギー性鼻炎	花粉、ハウスダスト(室内塵)などによる次のような鼻のアレルギー症状の緩和:鼻水、鼻づまり、くしゃみ	対象
			蕁麻疹		対象外
			皮膚疾患(湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症)に伴うそう痒		対象外
	フルチカゾンプロピオン酸エステル	○アレルギー性鼻炎 ○血管運動性鼻炎	アレルギー性鼻炎	花粉による季節性アレルギーの次のような症状の緩和:鼻づまり、鼻水(鼻汁過多)、くしゃみ	対象
			血管運動性鼻炎		対象
	モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	アレルギー性鼻炎	アレルギー性鼻炎	花粉による季節性アレルギーの次のような症状の緩和:鼻づまり、鼻水(鼻汁過多)、くしゃみ	対象
総合感冒剤等	塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾロン	諸種疾患による鼻充血・うっ血	諸種疾患による鼻充血・うっ血	急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は風鼻腔炎により次の諸症状の緩和:鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ、頭重(頭が重い)	対象
	サリチルアミド・アセトアミノフェン・対象外水カフェイン・ブロメタジンメチレンジサリチル酸塩	感冒もしくは上気道炎に伴う下記症状の改善及び緩和 鼻汁、鼻閉、咽・喉頭痛、頭痛、関節痛、筋肉痛、発熱	鼻汁	かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、鼻汁、鼻づまり、くしゃみ、悪寒(発熱による寒気)、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和	対象
			鼻閉		対象
			咽・喉頭痛		対象
			頭痛		対象
			関節痛		対象
			筋肉痛		対象
			発熱		対象
	Lーカルボシステイン	○下記疾患の去痰 上気道炎(咽頭炎、喉頭炎)、急性気管支炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核 ○慢性副鼻腔炎の排膿	上気道炎(咽頭炎、喉頭炎)	たん	対象
			急性気管支炎		対象
			気管支喘息		対象
			慢性気管支炎		対象
			気管支拡張症		対象
			肺結核		対象
			慢性副鼻腔炎の排膿		対象

領域	対象効成分	効能・効果(医療用)		効能・効果(OTC)	別途の負担の対象・対象外
緩下剤等	酸化マグネシウム	○下記疾患における制酸作用と症状の改善 胃・十二指腸潰瘍、胃炎(急・慢性胃炎、薬剤性胃炎を含む)、上部消化管機能異常(神経性食思不振、いわゆる胃下垂症、胃酸過多症を含む) ○便秘症 ○尿路蓚酸カルシウム結石の発生予防	胃・十二指腸潰瘍	○便秘 ○便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔	対象外
			胃炎(急・慢性胃炎、薬剤性胃炎を含む)		対象外
			上部消化管機能異常(神経性食思不振、いわゆる胃下垂症、胃酸過多症を含む)		対象外
			便秘症		対象
			尿路蓚酸カルシウム結石の発生予防		対象外
	ピコスルファートナトリウム水和物	○各種便秘症 ○術後排便補助 ○造影剤(硫酸バリウム)投与後の排便促進	各種便秘症	便秘。便秘に伴う次の症状の緩和:頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常醗酵、痔	対象
			術後排便補助		対象
			造影剤(硫酸バリウム)投与後の排便促進		対象
	ビサコジル	便秘症 消化管検査時又は手術前後における腸管内容物の排除	便秘症	便秘	対象
			消化管検査時又は手術前後における腸管内容物の排除		対象
	マルツエキス	○乳幼児の便秘 ○乳幼児の発育不良時の栄養補給	乳幼児の便秘	乳幼児の便秘 乳幼児の発育不良時の栄養補給 OTCで承認がある効能・効果 (和光堂マルツエキス 15100APZ02307000)	対象
			乳幼児の発育不良時の栄養補給		対象
	ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス	下痢症	下痢症	下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便	対象
	イトプリド塩酸塩	慢性胃炎における消化器症状(腹部膨満感、上腹部痛、食欲不振、胸やけ、悪心、嘔吐)	慢性胃炎における消化器症状(腹部膨満感、上腹部痛、食欲不振、胸やけ、悪心、嘔吐)	胃もたれ、胃部・腹部膨満感、食欲不振、胸やけ、はきけ、嘔吐	対象
	炭酸水素ナトリウム	(経口) ○下記疾患における制酸作用と症状の改善 胃・十二指腸潰瘍、胃炎(急・慢性胃炎、薬剤性胃炎を含む)、上部消化管機能異常(神経性食思不振、いわゆる胃下垂症、胃酸過多症を含む) ○アシドーシスの改善、尿酸排泄の促進と痛風発作の予防 (含嗽・吸入) ○上気道炎の補助療法(粘液溶解)	胃・十二指腸潰瘍	胃酸過多、胸やけ、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ、胃重、胸つかえ、げっぷ、吐き気(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐、飲みすぎ、胃痛	対象
			胃炎(急・慢性胃炎、薬剤性胃炎を含む)		対象
			上部消化管機能異常(神経性食思不振、いわゆる胃下垂症、胃酸過多症を含む)		対象
			アシドーシスの改善、尿酸排泄の促進と痛風発作の予防		対象外
			上気道炎の補助療法(粘液溶解)		対象外
ビタミン剤等	アスコルビン酸	○ビタミンC欠乏症の予防及び治療(壊血病、メルレル・バロー病) ○ビタミンCの需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給(消耗性疾患、妊産婦、授乳婦、はげしい肉体労働時など) ○下記疾患のうち、ビタミンCの欠乏または代謝障害が関与すると推定される場合(効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。) ・毛細管出血(鼻出血、歯肉出血、血尿など) ・薬物中毒 ・副腎皮質機能障害 ・骨折時の骨基質形成・骨癒合促進 ・肝斑・雀卵斑・炎症後の色素沈着 ・光線過敏性皮膚炎	ビタミンC欠乏症の予防及び治療(壊血病、メルレル・バロー病)	次の諸症状※の緩和:しみ、そばかす、日やけ・かぶれによる色素沈着 次の場合※の出血予防:歯ぐきからの出血、鼻出血 次の場合のビタミンCの補給:肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時、老年期	対象
			ビタミンCの需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給(消耗性疾患、妊産婦、授乳婦、はげしい肉体労働時など)		対象
			毛細管出血(鼻出血、歯肉出血、血尿など)		対象
			薬物中毒		対象外
			副腎皮質機能障害		対象外
			骨折時の骨基質形成・骨癒合促進		対象外
			肝斑・雀卵斑・炎症後の色素沈着		対象
			光線過敏性皮膚炎		対象外
	トコフェロール酢酸エステル	(1)ビタミンE欠乏症の予防及び治療 (2)末梢循環障害(間歇性跛行症、動脈硬化症、静脈血栓症、血栓性静脈炎、糖尿病性網膜症、凍瘡、四肢冷感症) (3)過酸化脂質の増加防止 (1)以外の効能については、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきではない。	ビタミンE欠乏症の予防及び治療	・末梢血行障害による次の諸症状の緩和 肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ ・更年期における次の諸症状の緩和 肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ ・月経不順 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」 ・次の場合のビタミンEの補給 老年期	対象
			末梢循環障害(間歇性跛行症、動脈硬化症、静脈血栓症、血栓性静脈炎、糖尿病性網膜症、凍瘡、四肢冷感症)		対象
			過酸化脂質の増加防止		対象外
	沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	RANKL阻害剤(デノスマブ(遺伝子組換え)等)投与に伴う低カルシウム血症の治療及び予防	RANKL阻害剤(デノスマブ(遺伝子組換え)等)投与に伴う低カルシウム血症の治療及び予防	次の場合のカルシウムの補給:妊娠・授乳期、老年期、発育期	対象

領域	対象効成分	効能・効果(医療用)		効能・効果(OTC)	別途の負担の対象・対象外
ステロイド	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	＜適応菌種＞ オキシテトラサイクリン感性菌 ＜適応症＞ ○深在性皮膚感染症、慢性膿皮症 ○湿潤、びらん、結痂を伴うか、又は二次感染を併発している次の疾患: 湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、ビダール苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎を含む) ○外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 ○歯周組織炎、感染性口内炎、舌炎	深在性皮膚感染症	化膿を伴う次の諸症:湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、しもやけ、虫さされ、じんましん 化膿性皮膚疾患(とびひ、めんちょう、毛のう炎)	対象
			慢性膿皮症		対象
			湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、ビダール苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎を含む)		対象
			外傷・熱傷及び手術創等の二次感染		対象
			歯周組織炎		対象外
			感染性口内炎		対象外
			舌炎		対象外
	デキサメタゾン	湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、女子顔面黒皮症、ビダール苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎を含む)、皮膚そう痒症、虫さされ、乾癬	湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、女子顔面黒皮症、ビダール苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎を含む)	湿疹、かぶれ、皮ふ炎、あせも、かゆみ、虫さされ、じんましん、しもやけ。	対象
			皮膚そう痒症		対象
			虫さされ		対象
			乾癬		対象外
	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、ビダール苔癬、脂漏性皮膚炎を含む)、痒疹群(蕁麻疹様苔癬、ストロフルス、固定蕁麻疹を含む)、乾癬、掌蹠膿疱症	湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、ビダール苔癬、脂漏性皮膚炎を含む)	湿疹、皮膚炎、かぶれ、かゆみ、虫さされ、あせも、じんましん	対象
			痒疹群(蕁麻疹様苔癬、ストロフルス、固定蕁麻疹を含む)		対象
			乾癬		対象外
			掌蹠膿疱症		対象外
	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、ビダール苔癬を含む)、痒疹群(固定じん麻疹、ストロフルスを含む)、虫さされ、乾癬、掌蹠膿疱症	湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、ビダール苔癬を含む)	湿疹、皮膚炎、かぶれ、かゆみ、あせも、虫さされ、じんましん	対象
			痒疹群(固定じん麻疹、ストロフルスを含む)		対象
			虫さされ		対象
			乾癬		対象外
			掌蹠膿疱症		対象外
	ベタメタゾン吉草酸エステル	湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、女子顔面黒皮症、ビダール苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎を含む)、皮膚そう痒症、痒疹群(蕁麻疹様苔癬、ストロフルス、固定蕁麻疹を含む)、虫さされ、乾癬、掌蹠膿疱症、扁平苔癬、光沢苔癬、毛孔性紅色粃糠疹、ジベルバラ色粃糠疹、紅斑症(多形滲出性紅斑、結節性紅斑、ダリエ遠心性環状紅斑)、紅皮症(悪性リンパ腫による紅皮症を含む)、慢性円板状エリテマトーデス、薬疹・中毒疹、円形脱毛症(悪性を含む)、熱傷(瘢痕、ケロイドを含む)、凍瘡、天疱瘡群、ジューリング疱疹状皮膚炎(類天疱瘡を含む)、痔核、鼓室形成手術・内耳開窓術・中耳根治手術の術創	湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、女子顔面黒皮症、ビダール苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎を含む)	湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん	対象
			皮膚そう痒症、痒疹群(蕁麻疹様苔癬、ストロフルス、固定蕁麻疹を含む)		対象
			虫さされ		対象
			乾癬		対象外
			掌蹠膿疱症		対象外
			扁平苔癬		対象外
			光沢苔癬		対象外
			毛孔性紅色粃糠疹		対象外
			ジベルバラ色粃糠疹		対象外
			紅斑症(多形滲出性紅斑、結節性紅斑、ダリエ遠心性環状紅斑)		対象外
			紅皮症(悪性リンパ腫による紅皮症を含む)		対象外
			慢性円板状エリテマトーデス		対象外
			薬疹・中毒疹		対象外
			円形脱毛症(悪性を含む)		対象外
			熱傷(瘢痕、ケロイドを含む)		対象外
			凍瘡		対象
			天疱瘡群		対象外
			ジューリング疱疹状皮膚炎(類天疱瘡を含む)		対象外
			痔核		対象外
			鼓室形成手術・内耳開窓術・中耳根治手術の術創		対象外
	ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩	〈適応菌種〉 フラジオマイシン感性菌 〈適応症〉 ○深在性皮膚感染症、慢性膿皮症 ○湿潤、びらん、結痂を伴うか、又は二次感染を併発している次の疾患: 湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、ビダール苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎を含む)、乾癬、虫さされ、痒疹群(固定蕁麻疹を含む) ○外傷・熱傷及び手術創等の二次感染 ○耳鼻咽喉科領域における術後処置	深在性皮膚感染症	化膿を伴う次の諸症:湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、しもやけ、虫さされ、じんましん 化膿性皮膚疾患(とびひ、めんちょう、毛のう炎)	対象
			慢性膿皮症		対象
			湿疹・皮膚炎群(進行性指掌角皮症、ビダール苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎を含む)		対象
			乾癬		対象外
			虫さされ		対象
			痒疹群(固定蕁麻疹を含む)		対象
			外傷・熱傷及び手術創等の二次感染		対象
			耳鼻咽喉科領域における術後処置		対象

領域	対象効成分	効能・効果（医療用）		効能・効果（OTC）	別途の負担の対象・対象外
皮膚保湿剤・皮膚保護剤・角化症治療剤	ヘパリン類似物質	血栓性静脈炎、血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患（注射後の硬結並びに疼痛）、肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と予防、進行性指掌角皮症、外傷（打撲、捻挫、挫傷）後の腫脹・血腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎、筋性斜頸（乳児期）、凍瘡	血栓性静脈炎	きず・火傷のあとの皮膚のしこり・つっぱり（顔面を除く）、手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかぎれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ（ただれを除く）、打ち身・捻挫後のはれ・筋肉痛・関節痛	対象外
			血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患（注射後の硬結並びに疼痛）		対象外
			肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と予防		対象
			進行性指掌角皮症		対象
			皮脂欠乏症		対象
			外傷（打撲、捻挫、挫傷）後の腫脹・血腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎		対象
			筋性斜頸（乳児期）		対象外
			凍瘡		対象
	イブプロフェンピコノール	急性湿疹、接触皮膚炎、アトピー皮膚炎、慢性湿疹、酒さ様皮膚炎・口周囲炎、帯状疱疹、尋常性ざ瘡	急性湿疹	ニキビ、吹き出物	対象外
			接触皮膚炎		対象外
			アトピー皮膚炎		対象外
			慢性湿疹		対象外
			酒さ様皮膚炎・口周囲炎		対象外
			帯状疱疹		対象外
			尋常性ざ瘡		対象
	酸化亜鉛	軽度の皮膚病変の収れん・消炎・保護・緩和な防腐	軽度の皮膚病変の収れん・消炎・保護・緩和な防腐	湿疹・皮膚炎、やけどによる潮紅、かぶれ、あせも、ただれ	対象
	チンク油	下記皮膚疾患の収れん、消炎、保護、緩和な防腐 小範囲の擦傷、小範囲の第一度熱傷、小範囲の湿疹・皮膚炎	小範囲の擦傷	小範囲の湿疹・皮膚炎、やけどによる潮紅	対象外
			小範囲の第一度熱傷		対象
			小範囲の湿疹・皮膚炎		対象
	サリチル酸	乾癬、白癬（頭部浅在性白癬、小水疱性斑状白癬、汗疱状白癬、頑癬）、鱗屑、紅色粃糠疹、紅色陰癬、角化症（尋常性魚鱗癬、先天性魚鱗癬、毛孔性苔癬、先天性手掌足底角化症（腫）、ダリエー病、遠山連圏状粃糠疹）、湿疹（角化を伴う）、口囲皮膚炎、掌蹠膿疱症、ヘブラ粃糠疹、アトピー性皮膚炎、痤瘡、癤、腋臭症、多汗症、その他角化性の皮膚疾患。	乾癬	水虫、いんきんたむし、ぜにたむし	対象外
			白癬（頭部浅在性白癬、小水疱性斑状白癬、汗疱状白癬、頑癬）		対象
			鱗屑		対象外
			紅色粃糠疹		対象外
			紅色陰癬		対象外
			角化症（尋常性魚鱗癬、先天性魚鱗癬、毛孔性苔癬、先天性手掌足底角化症（腫）、ダリエー病、遠山連圏状粃糠疹）		対象外
			湿疹（角化を伴う）		対象外
			口囲皮膚炎		対象外
			掌蹠膿疱症		対象外
			ヘブラ粃糠疹		対象外
			アトピー性皮膚炎		対象外
			痤瘡		対象外
			癤		対象外
			腋臭症		対象外
			多汗症		対象外
			その他角化性の皮膚疾患		対象外
		疣贅（ゆうぜい）、鶏眼（けいがん）、胼胝腫（べんちしゅ）の角質剥離	疣贅（ゆうぜい）、鶏眼（けいがん）、胼胝腫（べんちしゅ）の角質剥離	魚の目、たこ、いぼ	対象
	尿素	老人性乾皮症、アトピー皮膚、進行性指掌角皮症（主婦湿疹の乾燥型）、足蹠部皸裂性皮膚炎、掌蹠角化症、毛孔性苔癬、魚鱗癬	老人性乾皮症	手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌	対象
			アトピー皮膚		対象
			進行性指掌角皮症（主婦湿疹の乾燥型）		対象
			足蹠部皸裂性皮膚炎		対象
			掌蹠角化症		対象
			毛孔性苔癬		対象
			魚鱗癬		対象外
	白色ワセリン	軟膏基剤として調剤に用いる。 また、皮膚保護剤として用いる。	軟膏基剤として調剤に用いる。	手足のヒビ、アカギレ、皮膚のあれ、その他皮膚の保護	対象
			皮膚保護剤として用いる。		対象
皮膚の抗生物質	クロラムフェニコール	＜適応菌種＞ 本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属（肺炎球菌を除く）、腸球菌属、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー ＜適応症＞ 表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創の二次感染、びらん・潰瘍の二次感染	表在性皮膚感染症	化膿性皮膚疾患（とびひ、めんちょう、毛のう炎）	対象
			深在性皮膚感染症		対象
			慢性膿皮症		対象
			外傷・熱傷及び手術創の二次感染		対象
			びらん・潰瘍の二次感染		対象
	クロラムフェニコール・フラジオマイシン硫酸塩・プレドニゾロン	＜適応菌種＞ クロラムフェニコール/フラジオマイシン感性菌 ＜適応症＞ 深在性皮膚感染症、慢性膿皮症 湿潤、びらん、結痂を伴うか、又は二次感染を併発している次の疾患： 湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症、ビダール苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎を含む） 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染	深在性皮膚感染症	化膿を伴う次の諸症：湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、しもやけ、虫さされ、じんましん 化膿性皮膚疾患（とびひ、めんちょう、毛のう炎）	対象
			慢性膿皮症		対象
			湿疹・皮膚炎群（進行性指掌角皮症、ビダール苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎を含む）		対象
			外傷・熱傷及び手術創等の二次感染		対象

領域	対象効成分	効能・効果（医療用）		効能・効果（OTC）	別途の負担の対象・対象外
抗真菌薬	イソコナゾール硝酸塩	カンジダに起因する腟炎及び外陰腟炎	カンジダに起因する腟炎及び外陰腟炎	腟カンジダの再発。 （以前に医師から、腟カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る。）	対象
	オキシコナゾール硝酸塩	カンジダに起因する腟炎及び外陰腟炎	カンジダに起因する腟炎及び外陰腟炎	腟カンジダの再発（以前に医師から、腟カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る。）	対象
	クロトリマゾール	カンジダに起因する腟炎及び外陰腟炎	カンジダに起因する腟炎及び外陰腟炎	腟カンジダの再発（以前に医師から、腟カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る。）	対象
		下記の皮膚真菌症の治療 白癬：足部白癬（汗疱状白癬、趾間白癬）、頑癬、斑状小水疱性白癬 カンジダ症：指間糜爛症、間擦疹、乳児寄生菌性紅斑、皮膚カンジダ症、爪囲炎 癜風	足部白癬（汗疱状白癬、趾間白癬）	腟カンジダの再発による、発疹を伴う外陰部のかゆみ（以前に医師から、腟カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限る。）	対象
			頑癬		対象
			斑状小水疱性白癬		対象
			指間糜爛症		対象
			間擦疹		対象
			乳児寄生菌性紅斑		対象
			皮膚カンジダ症		対象
			爪囲炎		対象
			癜風		対象外
	ミコナゾール硝酸塩	下記の皮膚真菌症の治療 ○白癬：体部白癬（斑状小水疱性白癬、頑癬）、股部白癬（頑癬）、足部白癬（汗疱状白癬） ○カンジダ症：指間びらん症、間擦疹、乳児寄生菌性紅斑、爪囲炎、外陰カンジダ症、皮膚カンジダ症 ○癜風	体部白癬（斑状小水疱性白癬、頑癬）	腟カンジダの再発による、発疹を伴う外陰部のかゆみ（過去に医師の診断・治療を受けた方に限る） ただし、腟症状（おりもの、熱感等）を伴う場合は、必ず腟剤（腟に挿入する薬）を併用してください。	対象
			股部白癬（頑癬）		対象
			足部白癬（汗疱状白癬）		対象
			指間びらん症		対象
			間擦疹		対象
			乳児寄生菌性紅斑		対象
			爪囲炎		対象
			外陰カンジダ症		対象
			皮膚カンジダ症		対象
			癜風		対象外
		カンジダに起因する腟炎および外陰腟炎	カンジダに起因する腟炎および外陰腟炎	腟カンジダの再発（過去に医師の診断・治療を受けた方に限る）	対象
	テルビナフィン塩酸塩	下記の皮膚真菌症の治療 ○白癬：足白癬、体部白癬、股部白癬 ○皮膚カンジダ症：指間びらん症、間擦疹（乳児寄生菌性紅斑を含む） ○癜風	足白癬	水虫、いんきんたむし、ぜにたむし	対象
			体部白癬		対象
			股部白癬		対象
			指間びらん症		対象
			間擦疹（乳児寄生菌性紅斑を含む）		対象
			癜風		対象外
	ブテナフィン塩酸塩	下記の皮膚真菌症の治療 ○白癬：足部白癬、股部白癬、体部白癬 ○癜風	足部白癬	水虫、いんきんたむし、ぜにたむし	対象
			股部白癬		対象
			体部白癬		対象
			癜風		対象外
抗ウイルス薬	アシクロビル	単純疱疹	単純疱疹	口唇ヘルペスの再発（過去に医師の診断・治療を受けた方に限る）	対象
	ビダラビン	帯状疱疹、単純疱疹	帯状疱疹	口唇ヘルペスの再発（過去に医師の診断・治療を受けた方に限る）	対象外
			単純疱疹		対象
殺菌消毒剤等	トリアムシノロンアセトニド	慢性剥離性歯肉炎、びらん又は潰瘍を伴う難治性口内炎及び舌炎。	慢性剥離性歯肉炎	口内炎（アフタ性）	対象
			びらん又は潰瘍を伴う難治性口内炎及び舌炎。		対象
	イソプロパノール	手指・皮膚の消毒、医療機器の消毒	手指・皮膚の消毒	手指・皮膚の殺菌・消毒	対象
			医療機器の消毒		対象外
	エタノール	手指・皮膚の消毒 手術部位（手術野）の皮膚の消毒 医療機器の消毒	手指・皮膚の消毒	創傷面の殺菌・消毒	対象
			手術部位（手術野）の皮膚の消毒		対象
			医療機器の消毒		対象外
	オキシドール	○創傷・潰瘍の殺菌・消毒 ○外耳・内耳の炎症、鼻炎、咽喉頭炎、扁桃炎などの粘膜の炎症 ○口腔粘膜の消毒、齲窩及び根管の清掃・消毒、歯の清浄、口内炎の洗口	創傷・潰瘍の殺菌・消毒	きずの消毒・洗浄	対象
			外耳・内耳の炎症		対象外
			鼻炎、咽喉頭炎、扁桃炎などの粘膜の炎症		対象外
			口腔粘膜の消毒		対象外
			齲窩及び根管の清掃・消毒		対象外
			歯の清浄		対象外
			口内炎の洗口		対象外
	希ヨードチンキ	皮膚表面の一般消毒 創傷・潰瘍の殺菌・消毒 歯肉及び口腔粘膜の消毒、根管の消毒	皮膚表面の一般消毒	創傷面の殺菌・消毒	対象
			創傷・潰瘍の殺菌・消毒		対象
			歯肉及び口腔粘膜の消毒、根管の消毒		対象
	クロルヘキシジングルコン酸塩	○手指・皮膚の消毒、手術部位（手術野）の皮膚の消毒、皮膚の創傷部位の消毒、医療機器の消毒、手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒 ○結膜嚢の洗浄・消毒、産婦人科・泌尿器科における外陰・外性器の皮膚消毒	手指・皮膚の消毒	手指の消毒	対象
			手術部位（手術野）の皮膚の消毒		対象
			皮膚の創傷部位の消毒		対象
			医療機器の消毒		対象外
			手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒		対象外
			結膜嚢の洗浄・消毒		対象
			産婦人科・泌尿器科における外陰・外性器の皮膚消毒		対象
	次亜塩素酸ナトリウム	手指・皮膚の消毒、手術部位（手術野）の皮膚の消毒、手術部位（手術野）の粘膜の消毒、医療機器の消毒、手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒、排泄物の消毒、HBウイルスの消毒、患者用プール水の消毒	手指・皮膚の消毒	手指の消毒、食品製造器具の消毒、調理器具・食器の消毒、野菜・果実の消毒、飲料水の消毒、水泳プール水の消毒、便所・浴室の消毒、室内の消毒	対象
			手術部位（手術野）の皮膚の消毒		対象
			手術部位（手術野）の粘膜の消毒		対象
			医療機器の消毒		対象外
			手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒		対象
			排泄物の消毒		対象
			HBウイルスの消毒		対象外
			患者用プール水の消毒		対象外

領域	対象効成分	効能・効果（医療用）		効能・効果（OTC）	別途の負担の対象・対象外
殺菌消毒剤等	消毒用エタノール	手指・皮膚の消毒、手術部位（手術野）の皮膚の消毒、医療機器の消毒	手指・皮膚の消毒	創傷面の殺菌・消毒	対象
			手術部位（手術野）の皮膚の消毒		対象
			医療機器の消毒		対象外
	ベンザルコニウム塩化物	○手指・皮膚の消毒 ○手術部位（手術野）の皮膚の消毒 ○手術部位（手術野）の粘膜の消毒 ○皮膚・粘膜の創傷部位の消毒 ○感染皮膚面の消毒 ○医療機器の消毒 ○手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒 ○膣洗浄 ○結膜嚢の洗浄・消毒	手指・皮膚の消毒	手指、創傷面の殺菌・消毒。口腔内の殺菌・消毒	対象
			手術部位（手術野）の皮膚の消毒		対象
			手術部位（手術野）の粘膜の消毒		対象
			皮膚・粘膜の創傷部位の消毒		対象
			感染皮膚面の消毒		対象
			医療機器の消毒		対象外
			手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒		対象外
			膣洗浄		対象
			結膜嚢の洗浄・消毒		対象
	無水エタノール	○手指・皮膚の消毒 ○手術部位（手術野）の皮膚の消毒 ○医療機器の消毒	手指・皮膚の消毒	創傷面の殺菌・消毒	対象
			手術部位（手術野）の皮膚の消毒		対象
			医療機器の消毒		対象外
	複方ヨード・グリセリン	咽頭炎、喉頭炎、扁桃炎	咽頭炎	のどの殺菌・消毒	対象
			喉頭炎		対象
			扁桃炎		対象
	ポビドンヨード	咽頭炎、扁桃炎、口内炎、抜歯創を含む口腔創傷の感染予防、口腔内の消毒	咽頭炎	口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去	対象
			扁桃炎		対象
			口内炎		対象
			抜歯創を含む口腔創傷の感染予防		対象
			口腔内の消毒		対象
	ヨウ素	手術部位（手術野）の皮膚の消毒 手術部位（手術野）の粘膜の消毒 皮膚・粘膜の創傷部位の消毒 熱傷皮膚面の消毒	手術部位（手術野）の皮膚の消毒	のどの殺菌・消毒	対象
			手術部位（手術野）の粘膜の消毒		対象
			皮膚・粘膜の創傷部位の消毒		対象
			熱傷皮膚面の消毒		対象
	ホウ砂	結膜嚢の洗浄・消毒	結膜嚢の洗浄・消毒	結膜嚢の洗浄・消毒	対象
	ホウ酸	結膜嚢の洗浄・消毒	結膜嚢の洗浄・消毒	結膜嚢の洗浄・消毒	対象
残尿感薬、痔治療薬等その他	アンモニア水	（経口）アンモニア・ウイキョウ精の調剤原料に用いる。 （外用）虫さされ	（経口）アンモニア・ウイキョウ精の調剤原料に用いる。	虫さされ、虫さされによるかゆみ、気付け	対象
			（外用）虫さされ		対象
	フラボキサート塩酸塩	下記疾患に伴う頻尿、残尿感 神経性頻尿、慢性前立腺炎、慢性膀胱炎	神経性頻尿	女性における頻尿（排尿の回数が多い）、残尿感	対象
			慢性前立腺炎		対象
			慢性膀胱炎		対象
	静脈血管叢エキス	痔核の症状（出血、疼痛、腫脹、痒感）の緩解	痔核の症状（出血、疼痛、腫脹、痒感）の緩解	内痔核、外痔核の症状の緩解	対象
	ブドウ酒	○食欲増進、強壮、興奮 ○下痢 ○不眠症 ○無塩食事療法	食欲増進、強壮、興奮	食欲増進、強壮、興奮 下痢 不眠症 無塩食事療法	対象
			下痢		対象
			不眠症		対象
			無塩食事療法		対象
	オリブ油	軟膏剤、硬膏剤、リニメント剤などの基剤として調剤に用いる。 皮膚・粘膜の保護剤として用いる。	軟膏剤、硬膏剤、リニメント剤などの基剤として調剤に用いる。	皮膚の保護、日焼け炎症の防止、火傷、かぶれ	対象
			皮膚・粘膜の保護剤として用いる。		対象
	精製水	○溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。 ○医療機器の洗浄に用いる。	溶解剤として製剤、試薬、試液の調製に用いる。	製剤、試薬、試液の溶解剤として用いる。医療機器の洗浄に用いる。 【その他の用途】 コンタクトレンズの洗浄剤、保存剤の溶解に用いる。（コンタクトレンズ装着液としては用いないこと。）	対象
			医療機器の洗浄に用いる。		対象
	ハチミツ	矯味の目的で、または丸剤の結合剤、栄養剤として調剤に用いる。 または皮膚・粘膜の保護剤として用いる。	矯味の目的で、または丸剤の結合剤、栄養剤として調剤に用いる。	栄養剤、甘味剤、口唇の亀裂、あれ	対象
			皮膚・粘膜の保護剤として用いる。		対象
睡眠薬	ラメルテオン	不眠症における入眠困難の改善	不眠症における入眠困難の改善	一時的な不眠の次の症状の緩和：寝つきが悪い	対象

※1　令和7年12月25日に医療保険部会で公表した成分一覧のうち、ポリエンホスファチジルコリンについては、
令和8年4月1日時点で対象となる医薬品がすべて薬価削除となっているため、本品目一覧には含まれていない
※2　ラメルテオンについて、令和8年7月末にOTC医薬品の販売が開始され、医療用医薬品と【成分、投与経路が同一で、一日最大用量が異ならない】条件に合致するため、対象成分に追加